

И. Спрыгинъ.

58
с74

**О некоторых
редких растеніяхъ
Пензенской губерніи.**


О Г Л А В Л Е Н І Е.

Вып. I Трудов Ова.


И. Спрыгинъ. О некоторых редких растеніяхъ Пензенской губерніи	1— 18
Н. В. Дюкина. Грибные паразиты Пензенской губ. 1912 г. 19—	28
Е. К. Штукенбергъ. Списокъ грибовъ-вредителей, хранящихся въ музеѣ Пензенскаго Общества Любителей Естествознанія.	29— 42

Пенза.

1913г.



Литературныя свѣдѣнія по флорѣ Пензенской губерніи, какъ и многихъ другихъ губерній Средней Россіи, какъ извѣстно, крайне скудны. По числу указанныхъ для нея видовъ и по полнотѣ свѣдѣній объ ихъ распространеніи Пензенская губернія даже замѣтно отстаетъ отъ прочихъ. Такъ, если обратиться къ остающемуся до сего времени единственнымъ полному своду флористическихъ данныхъ по Средней Россіи „Сборнику свѣдѣній о флорѣ Средней Россіи“ В. Я. Цингера, то видовой составъ флоры Пензенской и сосѣднихъ съ ней губерній выразится слѣдующими цифрами: цвѣтковыхъ и vyšшихъ споровыхъ растений ко времени изданія труда В. Я. Цингера (1885 г.) числилось: въ Симбирской 838 видовъ, въ Нижегородской 842, въ Тамбовской 1100, въ Саратовской 1395, въ то время какъ въ Пензенской всего 717. Если даже исключить Саратовскую губернію, какъ протянувшуюся на большое разстояніе въ меридіональномъ направленіи и захватившую поэтому нѣсколько различныхъ по флорѣ растительныхъ зонъ, то все-таки замѣтна разница въ числѣ видовъ Пензенской и другихъ губерній. Правда, за 28 лѣтъ, протекившія послѣ выхода въ свѣтъ работы В. Я. Цингера число видовъ, извѣстныхъ въ Пензенской губ., значительно увеличилось. Опубликованный въ 1890 г. К. А. Космовскимъ списокъ сѣменныхъ и vyšшихъ споровыхъ растений Пензенской губерніи насчитываетъ уже 850 видовъ, а затѣмъ экскурсіи А. Н. Магницкаго, А. Хитрово, В. Любименко, Д. И. Литвинова, Оленина, автора этой замѣтки и др. прибавили еще до сотни новыхъ для губерніи видовъ, и число ихъ въ настоящее время немного не доходитъ до 950. Но и при всемъ этомъ, если принять во вниманіе, что одновременно производились изслѣдованія и въ сосѣднихъ губерніяхъ, число видовъ для нашей губерніи нельзя считать



достаточно полнымъ, и въ настоящій моментъ, возможно, одна Симбирская губернія, сравнительно мало пользовавшаяся въ послѣднее время вниманіемъ ботаниковъ, отстаетъ въ этомъ отношеніи отъ Пензенской. Скудость свѣдѣній о флорѣ губерніи Пензенской станетъ еще болѣе ощутительной, если обратиться къ другой сторонѣ вопроса, именно къ даннымъ о распространеніи каждаго вида въ губерніи. Просматривая списокъ видовъ, я нашелъ, что относительно 100 слишкомъ видовъ имѣются лишь очень скудные свѣдѣнія о ихъ распространеніи по территоріи губерніи—указано лишь нѣсколько (не болѣе десятка) мѣстонахожденій въ предѣлахъ цѣлой губерніи, это относится не только къ дѣйствительно рѣдкимъ въ Средней Россіи видамъ, но и довольно обыкновеннымъ, какими являются, напримѣръ, виды *Stipa*, *Scorzonera purpurea*, *Lupinea cyanoïdes*, *Echium rubrum*, *Nonnea Pulla* и т. п. Относительно нѣкоторыхъ видовъ имѣются лишь весьма старыя указанія, приведенныя Ледебуромъ въ его „*Flora Rossica*“ и не подтвержденныя позднѣйшими изслѣдователями.

За послѣдніе годы, изслѣдуя въ ботаническомъ отношеніи Пензенскую губернію по порученію Губернской Земской Управы, я имѣлъ возможность объѣздить все уѣзды губерніи. Хотя главной цѣлью поѣздки были ботанико-географическія изслѣдованія, но попутно былъ собранъ большой флористическій матеріалъ. Такъ какъ окончательная обработка послѣдняго потребуетъ довольно значительнаго періода времени, то я рѣшилъ по мѣрѣ обработки гербарія опубликовывать въ краткихъ замѣткахъ свѣдѣнія о наиболѣе рѣдкихъ растеніяхъ Пензенской губерніи.

Кромѣ данныхъ, собранныхъ мною лично, ниже приводятся нѣкоторыя свѣдѣнія на основаніи сборовъ другихъ лицъ, пожертвовавшихъ свои гербаріи въ музей Пензенскаго Общества Любителей Естествознанія.

Нѣкоторые изъ указанныхъ въ этой замѣткѣ видовъ впервые приводятся для Пензенской губ.; таковыя отмѣчены *.

Thalictrum angustifolium Jacq. Это растение, весьма обыкновенное во всей западной и большей части Средней Россіи, становится рѣдкимъ на востокъ послѣдней. Заливные луга у г. Идриа Казанской губерніи являются самымъ восточнымъ изъ извѣстныхъ мѣстонахожденій этого растенія въ Россіи. Для Пензенской губерніи видъ этотъ показанъ былъ Ледебуромъ по даннымъ Жаке, послѣ котораго въ губерніи не наблюдался. Это показаніе настолько являлось сомнительнымъ, что С. И. Коржинскій прямо говоритъ, что *Th. angustifolium* „въ Симбирской и Пензенской губ. не найденъ“. Въ музей Пензенскаго Общества нѣсколько экземпляровъ этого вида были доставлены членомъ Общества Я. Т. Симаковымъ, собравшимъ ихъ на лѣсныхъ лугахъ около с. Буды Наровчатскаго уѣзда, гдѣ по словамъ его это растеніе наблюдается въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ. По моей просьбѣ Я. Т. на слѣдующій годъ собралъ въ томъ же мѣстѣ еще около десятка экземпляровъ *Th. angustifolium*, которые и хранятся въ настоящее время въ гербаріи музея.

Ranunculus polyphyllus W. K. Весьма рѣдкое растеніе, обитающее въ озерахъ и старицахъ заливныхъ долинъ рѣкъ. Видъ этотъ былъ указанъ мною для Пензенской губерніи еще въ 1896 г. (озеро Крутое въ долинѣ Суры около с. Черкасъ подъ Пензою). Одновременно А. Н. Магницкимъ былъ указанъ для Городищенскаго уѣзда. Вторично мною *R. polyphyllus* найденъ въ Чембарскомъ уѣздѣ въ наполненной водой водораздѣльной западинѣ около д. Васильевки близъ границы съ Саратовской губерніей (11 іюля 1911 г. съ цвѣтами и незрѣлыми плодами).

Dentaria quinquefolia M. B. Указывалось мною ранѣе для окрестностей разѣзда Арбеково (къ западу отъ Пензы) Въ 1910 г. 22-го апрѣля съ цвѣтами найдено въ лѣсу у разѣзда Выглядовки въ Н.-Ломовскомъ уѣздѣ.

Nasturtium austriacum Crutz. Сыроватое мѣсто среди степной залежи въ имѣніи А. Н. Селиванова около с. Алеевки Пензенскаго уѣзда.

Arabis pendula L. Пензенскій уѣздъ, оврагъ въ лѣсу у дороги изъ дер. Ключи въ дер. Александровку.

Sisymbrium junceum MB. Кромѣ указанныхъ ранѣе мѣсто-нахожденій найдено въ Пензенскомъ уѣздѣ: на ковыльно-типчаковой степи около дер. Озерки, по ковыльнымъ склонамъ въ степи у дер. Поперечной и въ песчаной степи на буграхъ по правому берегу р. Ардыма около с. Борисовки; въ Инсарскомъ уѣздѣ по степнымъ склонамъ около деревни Николаевки (юго-восточная часть уѣзда).

Sisymbrium rannonicum Jacq. По песчанымъ берегамъ рѣки Суры около с. Ломовки Мокшанскаго уѣзда.

Alliaria officinalis Andr. Пензенскій уѣздъ: дубовый лѣсъ въ урочищѣ Чугуры около дер. Куриловки.

* Lepidium latifolium L. Заросль изъ немногихъ экземпляровъ найдена въ этомъ году на пескахъ заливной долины Суры въ урочищѣ Кичкилейкѣ Городищенскаго уѣзда.

Isatis tinctoria L. На полянахъ и въ посѣвахъ среди мелко-лѣся между с.с. Кривозерьевкой и Панкратовкой Пензенскаго уѣзда.

Chorispora tenella DC. Степные склоны у д. Елшанки Пензенскаго уѣзда.

* Drosera anglica Huds. Это растение, впервые указывающееся для Пензенской губерніи, найдено на Моховомъ болотѣ „Трясучее“ около с. Казачьей Пелетью Мокшанскаго уѣзда.

Drosera rotundifolia L. Тамъ-же, гдѣ и предыдущее, и кромѣ того на сфагновомъ болотѣ въ южной части Засурскаго лѣсничества Городищенскаго уѣзда.

Polygala sibirica L. Выходы мѣла у сс. Гарта и Дегилевки Саранскаго уѣзда.

Dianthus campestris MB. Саранскій уѣздъ: степь у оврага Сеялатки близъ с. Семилей и степь съ *Stipa capillata* на холмѣ Чердакъ у с. Бѣлый Ключъ; Мокшанскій уѣздъ: степные склоны у д. Катинъ Хуторъ; степь вл. Волконскаго у дер. Алексѣевки (ю.-з. часть уѣзда); степь въ урочищѣ „Воровскія Вершины“ у Лопатинскаго Хутора.

Gypsophilla altissima L. Саранскій уѣздъ: выхода мѣла въ оврагѣ между с.с. Атемаромъ и Удой; также на выработкахъ мѣла около Атемара и въ степи съ *Stipa capillata* на холмѣ Чердакъ у с. Бѣлый Ключъ.

Silene sibirica Pers. Въ Мокшанскомъ уѣздѣ въ заросли *Amygdalus napa* около дер. Николаевки (къ югу отъ р. Шукши); въ Инсарскомъ уѣздѣ по степному склону около дер. Николаевки (ю.-вост. часть уѣзда); въ Саранскомъ уѣздѣ на участкѣ степи у оврага Сеязатки близъ с. Семилей.

Silene repens Patrin. Въ Пензенскомъ уѣздѣ: на участкѣ травяной степи въ урочищѣ „Поповъ оврагъ“ въ дачѣ села Веселовки, у опушки лѣса рядомъ со степью близъ разъѣзда Арбеково, въ заросли *Rubus spinosa* у с-ца Васильевки; въ Мокшанскомъ уѣздѣ: склоны холма Шоломъ у с. Бѣлогорки.

* Linum nervosum W. K. На степи „Дубровка“ близъ дер. Ивинки Пензенскаго уѣзда рядомъ съ границей Чембарскаго уѣзда. Растеніе это, являющееся новымъ для Пензенской губерніи, до сихъ поръ было извѣстно въ Средней Россіи лишь изъ Орловской и Тамбовской губ.

* Linum repenne L. Этотъ видъ льна также впервые указывается для Пензенской губ. и найденъ былъ въ Саранскомъ уѣздѣ на выходахъ мѣла по склонамъ оврага между с.с. Атемаромъ и Удой.

Geranium Robertianum L. Овраги у дачъ „Кичкилейка“ въ лѣсу по правому берегу Суры Городищенскаго уѣзда, также въ тѣнистомъ лѣсу въ урочищѣ „Чугуры“ у дер. Курпловки Пензенскаго уѣзда.

Acer campestre L. Некленъ въ Пензенской и Саратовской губ. находитъ западную границу своего распространенія. Для Пензенской губерніи онъ указывался Боде и Ледебуромъ. Космовскій, проѣхавшій по западной части Пензенской губерніи, говоритъ, что ему не удавалось замѣчать неклена. Поэтому даже въ послѣднемъ изданіи Флоры Средней Россіи Маевскаго мѣстонахожденіе *Acer campestre* въ Пензенской губерніи указано, какъ сомнительное. Проѣзжая въ 1911 г.

мимо опушки мелкаго лѣса около с. Ушенка, я нашелъ нѣсколько кустиковъ неклена, затѣмъ онъ попадался еще въ нѣсколькихъ мѣстахъ этого уѣзда, напр. около с. Коповки и дер. Фелицатовки (на границѣ съ Н.-Ломовскимъ уѣздомъ). Въ послѣднемъ пунктѣ были и небольшія деревца съ плодами. Въ 1912 г. М. Г. Попову удалось найти неклеи еще въ нѣсколькихъ пунктахъ, но уже въ предѣлахъ Исарскаго уѣзда, гдѣ самымъ восточнымъ пунктомъ изъ извѣстныхъ мѣстонахожденій *A. campestre* въ губерніи являются окрестности станціи Хованщина Моск.-Каз. ж. д. Любопытно, что несмотря на тщательные поиски, клеи не найденъ въ промежуточныхъ между указанными уѣздахъ Н.-Ломовскомъ и Наровчатскомъ, а также и въ Чембарскомъ уѣздѣ, гдѣ не удалось найти ни также *Evonymus europaeus* L., хотя послѣдній и указывается для этого уѣзда Космовскимъ.

Astragalus austriacus L. М. Г. Поповымъ найдено въ Саранскомъ уѣздѣ около с. Атемара на кучахъ выброшеннаго изъ каменоломенъ мѣла.

Lathyrus tuberosus L. Въ Мокшанскомъ уѣздѣ по степнымъ склонамъ у дер. Катинъ Хуторъ; въ заросли *Prunus Chamaecerasus* у дер. Лягушевки, въ заросли *Amygdalus nana* у дер. Николаевки (ю.-в. часть уѣзда); изъ того же уѣзда изъ окрестностей с. Липовки доставлено В. С. Малыгинымъ.

Lathyrus paluster L. Въ ивнякахъ и заросляхъ тростника по р. Синяевкѣ у с. Михайловскихъ Кучекъ Пензенскаго уѣзда.

Potentilla recta L. На полянахъ въ лѣсу около с. Бекетовки Мокшанскаго уѣзда (ю.-з. часть уѣзда) и на выходахъ мѣла у с. Гартъ Саранскаго уѣзда. Въ послѣднемъ найдено также на склонѣ съ *Stipa capillata* L. у с. Бѣлый Ключъ.

Potentilla longipes Ledeb. Въ Пензенскомъ уѣздѣ: степь около развѣзда Арбекова, въ ковыльно-типчаковой степи и на залежи около д. Поперечной; на участкахъ травяной степи около селеній Марьевки и Павловки и близъ ст. Рамзай; въ

Мокшанскомъ уѣздѣ на степи около Лопатинскаго Хутора.

* Potentilla supina L. Изъ Городищенскаго уѣзда (окрестности ст. Леонидовки) доставлена К. Е. Гомеровымъ.

Rubus suberectus Anders. Указывалась ранѣе для Пензенской губ. Кляусомъ и Ледебуромъ. Космовскій не нашелъ этого вида въ предѣлахъ губерніи, хотя видѣлъ его верстахъ въ 20 отъ границы губерніи въ Саровскихъ лѣсахъ. Мнѣ удалось найти *R. suberectus* въ нѣсколькихъ пунктахъ сѣверной части Краснослободскаго уѣзда, изъ которыхъ укажу окрестности Ново-Ямской Слободы (окраина сфагнового болота въ монастырскомъ лѣсу) и Бортно-Проказниинскую казенную дачу (въ сыроватомъ березовомъ лѣсу). Среди мѣстнаго населенія это растеніе извѣстно подъ характернымъ названіемъ «полумалина».

Tigra nataus L. Какъ указывалъ я ранѣе, встрѣчается въ заводяхъ Суры около Пензы. Затѣмъ въ музей имѣются плоды *Tigra nataus* изъ слѣдующихъ пунктовъ: изъ р. Ардыма у с. Лебедевки Пензенскаго уѣзда, изъ окрестностей Тумолки Инсарскаго уѣзда и изъ окрестностей с. Большой Вясы Саранскаго уѣзда.

Trinia Henningii Hoffm. Въ Пензенскомъ уѣздѣ на участкахъ травяной степи около дер. Поперечной, с. Крутець, дер. Марьевки, дер. Озерокъ, с. Веселовки, (урочище „Поповъ Оврагъ“), на залежи въ имѣніи А. Н. Селиванова около с. Аленьки; въ Чембарскомъ уѣздѣ въ заросли *Amygdalus* папа около с. Петровскаго (въ западной части уѣзда).

* Vupleurum falcatum L. Это растеніе, довольно рѣдкое въ Средней Россіи, является новостью для Пензенской губ. Встрѣчено лишь въ небольшомъ районѣ западной части Саранскаго уѣзда, гдѣ приурочено къ выходамъ мѣла и другихъ карбонатныхъ породъ (с.с. Гартъ, Дегилевка, Уда, Атемаръ, Жмакино, Бѣлый Ключъ).

* Silaus Besseri DC. Также впервые указывается для Пензенской губ. Характерное растеніе для солонцеватыхъ степей южной части губерніи. Найдено въ уѣздахъ: Пензен-

скомъ (с. Липяги въ южной части уѣзда), Чембарскомъ (дер. Грязнуха) и Мокшанскомъ (дер. Лягушевка на р. Шукшѣ).

* Valeriana dubia Bge. Выдѣляю какъ самостоятельный видъ, такъ какъ кромѣ систематическихъ признаковъ отличается отъ типичной формы *Valeriana officinalis* болѣе раннимъ цвѣтеніемъ (зацвѣтаетъ въ половинѣ мая, т. е. мѣсяцемъ ранѣе, чѣмъ *V. officinalis* L.) и характеромъ мѣстообитанія. Въ то время, какъ *V. officinalis* встрѣчается на заливныхъ и болотистыхъ лугахъ, по сырымъ кустарникамъ и т. под. мѣстамъ, *V. dubia* представляетъ одно изъ типичныхъ растений для травяныхъ степей Пензенской губерніи.

Изъ мѣстонахожденій ея укажу слѣдующія: въ Пензенскомъ уѣздѣ—степь около разѣзда Арбеково; степи у Пѣшаго* бордона и въ урочищѣ „Поповъ оврагъ“ въ дачѣ села Веселовки, степь около с. Крутецъ, степь около дер. Поперечной, степь около дер. Озерокъ и степь около дер. Ивинки; въ Чембарскомъ уѣздѣ—степь въ урочищѣ „Зимница“ у с. Атмисъ, степь у с. Тарханъ, степь у с. Алексѣевки (западная часть уѣзда); въ Мокшанскомъ уѣздѣ—степь около дер. Еланки и степь около дер. Алексѣевки (ю. з. часть уѣзда); въ Инсарскомъ уѣздѣ степные склоны у дер. Николаевки (ю.-в. часть уѣзда).

Galatella punctata Lindl. Въ сыроватой баклушѣ у опушки лѣса въ Пензенской казенной дачѣ у дер. Вителевки и среди заливного луга въ долинѣ Суры въ урочищѣ Кичкилейкѣ Городищенскаго уѣзда.

Galatella Hauptii Lindl. Это рѣдкое въ Европейской Россіи растение было найдено впервые въ Пензенской губерніи Колаковскимъ на обрывахъ у с. Юровка Мокшанскаго уѣзда и доставлено В. Я. Цингеру. Затѣмъ мною наблюдалось около д.д. Крутца и Еланки Пензенскаго уѣзда ¹⁾. Въ 1909 г.

¹⁾ См. почвенныя и ботаническія изслѣдованія въ Пензенскомъ и Городищенскомъ уѣздахъ Тр. Каз. Общ. Ест. Т. XXXIII, в. 5, стр. 51. Тамъ-же подъ именемъ *Galatella Hauptii* ошибочно указано *Aster Linosyris* Bernh. изъ дубява около д. Панкратовки.

въ большомъ количествѣ экземпляровъ встрѣтилъ это растеніе на участкѣ песчаной степи по склону къ р. Мокшѣ у с. Владыкина Мокшанскаго уѣзда недалеко отъ мѣсто-нахожденія, указаннаго Колаковскимъ и въ 1910 г. на буграхъ по правому берегу Ардыма около с. Борисовки Пензенскаго уѣзда.

Aster Linosyris Bernh. Указывалось для Пензенской губ. лишь Ледебуромъ по даннымъ Жаке. Найдено теперь въ нѣсколькихъ пунктахъ губерніи: въ Пензенскомъ уѣздѣ—на участкѣ песчаной степи около сельца Васильевки; въ мелкомъ дубнякѣ около дер. Панкратовки (см. примѣчаніе къ *Galatella Hauptii*); на участкѣ степи съ *Avena desertorum* у дер. Поперечной ¹⁾; въ Мокшанскомъ уѣздѣ въ заросли *Spigaea crenifolia* на холмѣ Шоломъ у с. Бѣлогорки; въ Саранскомъ уѣздѣ на степномъ склонѣ съ *Stipa capillata* на холмѣ Чердакъ у с. Бѣлый Ключъ.

Aster villosus Benth. et Hook. На участкѣ песчаной степи съ *Stipa capillata* по склону у с. Конопать Инсарскаго уѣзда.

* Inula germanica L. Въ кустарниковой степи около села Бѣлогорки и дер. Лягушевки Мокшанскаго уѣзда.

Achillea nobilis L. ²⁾. Степь „Дубровка“—около дер. Ивинки Пензенскаго уѣзда; изъ окрестностей с. Завиваловки Чембарскаго уѣзда доставлено въ гербарій общества Д. И. Еланскимъ.

Artemisia pontica L. Въ Пензенскомъ уѣздѣ: кустарниковая степь около с. Васильевки и дер. Поперечной, степная залежь у дер. Марьевки; въ Мокшанскомъ уѣздѣ: травяная степь около Лопатинскаго хутора, кустарниковая степь

¹⁾ Въ предварительномъ отчетѣ о ботаническихъ изслѣдованіяхъ въ 1909 и 1910 г.г. ошибочно приведено подъ именемъ *Aster Hauptii* (?).

²⁾ Указаніе для Пензенской губерніи пропущено въ послѣднемъ изданіи Флоры Средней Россіи Маевского, хотя для Пензенской губ. показана была еще Космоверхинскимъ.

около с.с. Левина, Николаевки, Лягушевки; по склонамъ холма Шоломъ около Бѣлогорки; въ Н.-Ломовскомъ уѣздѣ заросль *Amygdalus nana* у границы съ Чембарскимъ уѣздомъ къ югу отъ с. Каменки; въ Инсарскомъ уѣздѣ: степные склоны около дер. Николаевки (ю.-в. часть уѣзда).

Artemisia armeniaca Lam. Видъ этотъ, указывавшійся до сихъ поръ только для очень немногихъ пунктовъ Пензенской губерніи, является однимъ изъ обыкновенныхъ растений на участкахъ травяной степи въ южныхъ уѣздахъ.

Artemisia sericea Web. Кромѣ указанныхъ ранѣ пунктовъ найдено въ Пензенскомъ уѣздѣ на участкахъ травяной степи около с.с. Крутецъ, Поперечной, Ивинки, Марьевки, Озерокъ, Литонина, также въ заросли *Rgulus spinosa* у села Васильевки; въ Мокшанскомъ уѣздѣ на степи около деревень Еланки и Алексѣевки и на участкѣ песчаной степи по склону къ Мокшѣ у с. Владыкино; въ Н.-Ломовскомъ уѣздѣ на генеральной межѣ у с. Муравы; въ Саранскомъ уѣздѣ по степному склону съ *Stipa capillata* на холмѣ Чердакъ у с. Бѣлый Ключъ.

* *Artemisia Dracunculus* L. Пензенскій уѣздъ: степные склоны въ урочищѣ „Чугуры“ у дер. Куриловки и въ песчаной степи на правомъ берегу Ардыма у с. Борисовки.

Artemisia latifolia Ldb. На участкахъ травяной степи въ Пензенскомъ уѣздѣ около Поперечной, Павловки, Ивинки, Литонина, с. Крутецъ, Марьевки; въ Мокшанскомъ уѣздѣ: около Лопатинскаго Хутора, Алексѣевки и Еланки; въ Саранскомъ уѣздѣ около с. Семилей (по склону къ рѣкѣ Селлатѣ); въ Чембарскомъ уѣздѣ около с. Тарханы и Атмиса (уроч. Зимница), также по степнымъ склонамъ у дер. Николаевки Инсарскаго уѣзда и на обнаженіяхъ мѣла у с. Дегилевки Саранскаго уѣзда.

Senecio Doria L. Въ дачѣ с. Веселовки Пензенскаго уѣзда: на степи въ урочищѣ „Поповъ оврагъ“ и въ заросли *Rgulus spinosa* у Пѣшаго кордона.

Senecio sarraceanicus L. По ивицамъ въ дачѣ с. Терновки Пензенскаго уѣзда у дороги изъ Пензы въ дачное мѣсто Ахуны.

Senecio campester DC. Было указано до сихъ поръ для немногихъ пунктовъ губерніи; по изслѣдованіямъ послѣднихъ лѣтъ представляетъ обыкновенное растеніе на участкахъ травяной степи въ южныхъ уѣздахъ.

Echinops Ritro L. Чембарскій уѣздъ: песчаная степь по оврагу около дер. Наумовки (ю. часть уѣзда); Мокшанскій уѣздъ: солончаковая залежь у дер. Лягушевки; Саранскій уѣздъ: ломки мѣла у с. Атемара.

Centaurea Ruthenica Lam. На степномъ склонѣ съ *Stipa capillata L.* на холмѣ Чердакъ около с. Бѣлый Ключъ Саранскаго уѣзда; встрѣчается также по историческому валу около с. Рамзай Пензенскаго уѣзда.

Centaurea maculosa Lam. По насыпи желѣзной дороги у ст. Арапово въ Наровчатскомъ уѣздѣ.

Serratula coronata L. Въ травяной степи у дер. Литонино (Новопетровской) Пензенскаго уѣзда; въ Мокшанскомъ уѣздѣ: въ заросли *Amygdalus nana* у с. Левина, на болотистыхъ мѣстахъ въ урочищѣ „Михайловская степь“ у с. Азяся и въ участкахъ травяной степи у д.д. Еланки и Алексѣевки (ю.-з. часть уѣзда); также на заливныхъ лугахъ праваго берега Суры близъ дачъ Кичкилейки Городищенскаго уѣзда.

Scorzonera stricta Horn. На участкахъ песчаной степи: въ Пензенскомъ уѣздѣ у дер. Синяевки и въ Хоненевскомъ оврагѣ (между Пензой и Малой Еланью) и въ Мокшанскомъ уѣздѣ на холмѣ Шоломъ у с. Бѣлогорки.

Scorzonera hispanica L. На участкахъ песчаной степи около дер. Синяевки и въ Хоненевскомъ оврагѣ въ Пензенскомъ уѣздѣ.

Hieracium virosum Pall. На склонахъ въ степи у д. Поперечной Пензенскаго уѣзда и на склонѣ холма „Левина гора“ у с. Шерганъ Мокшанскаго уѣзда.

Campanula rotundifolia L. Въ Городищенскомъ уѣздѣ въ Засурскомъ лѣсничествѣ близъ кордоновъ Бурчи и Теплаго, гдѣ изрѣдка попадается на полянахъ въ бору.

Campanula Steveni MB. Одно изъ самыхъ обыкновенныхъ растений на участкахъ травяной степи въ Пензенскомъ уѣздѣ; попадается также и въ другихъ южныхъ уѣздахъ.

Vaccinium uliginosum L. По торфянымъ болотамъ сѣверной части Краснослободскаго уѣзда.

Oxycoccus palustris Pers. Болото „Трясучее“ въ бору у с. Казачьей Пелетьмы Мокшанскаго уѣзда; по торфянымъ болотамъ въ Засурскомъ лѣсничествѣ Городищенскаго уѣзда и въ Бортно-Проказинской дачѣ Краснослободскаго уѣзда.

Cassandra calyculata Don. Болото „Трясучее“ у с. Казачьей Пелетьмы Мокшанскаго уѣзда; торфяныя болота въ Бортно-Проказинской дачѣ Краснослободскаго уѣзда.

* Ledum palustre L. По торфянымъ болотамъ въ сѣверной части Краснослободскаго уѣзда: около с. Ельники („Черничное болото“), Надеждино (собр. В. С. Малыгинымъ) и въ Бортно-Проказинской казенной дачѣ.

Hyrophytes multiflora Scop. Въ дубовомъ лѣсу между с.с. Бекетовкой и Фатеевкой Мокшанскаго уѣзда и по смѣшаннымъ и сосновымъ лѣсамъ въ южной части Засурскаго лѣсничества и дачѣ Успенскаго въ урочищѣ Кичкилейка Городищенскаго уѣзда.

Onosma simplicissimum L. Въ Саранскомъ уѣздѣ на выходахъ мѣла въ оврагѣ между с.с. Атемаромъ и Удой и на степномъ склонѣ съ *Stipa capillata* на холмѣ Чердакъ около с. Бѣлый Ключъ.

Melampyrum arvense L. На склонѣ съ *Stipa capillata* у села Бѣлый Ключъ Саранскаго уѣзда.

Salvia glutinosa L. А. Н. Магницкимъ доставлено въ музей Общества изъ окрестностей с. Каменки Н.-Ломовскаго у.

Salvia verticillata L. Въ кустарниковой степи около д. Лягушевки Мокшанскаго уѣзда и на выходахъ карбонатныхъ породъ у с. Бѣлый Ключъ Саранскаго уѣзда.

Scutellaria hastifolia L. Принадлежить къ числу рѣдкихъ въ нашей губерніи растений. Найдено въ Н.-Ломовскомъ у. въ кустарниковой степи по склону къ оврагу Горѣлому у с. Хуторъ.

* Euphorbia desertorum Weinm. Было указано когда-то Вейнманомъ для Тамбовской губ., затѣмъ нигдѣ въ Средней Россіи не было находимо. Въ небольшомъ количествѣ экземпляровъ это растеніе найдено было на степныхъ склонахъ около д. Елшанки Пензенскаго у. въ имѣніи А. А. Андреева. Собранные экземпляры *Euphorbia desertorum* были опредѣлены В. И. Липскимъ.

* Plantago d'Urvillei Opiz. На склонахъ въ степи у дер. Поперечной Пензенскаго у., въ кустарниковой степи около дер. Лягушевки Мокшанскаго уѣзда и на степномъ склонѣ съ *Stipa capillata* на холмѣ Чердакъ у с. Бѣлый Ключъ Саранскаго уѣзда.

Scheuchzeria palustris L. Болото „Трясучее“ у с. Казачьей Пелетьмы Мокшанскаго уѣзда.

Syrpidium Calceolus L. Въ лиственномъ лѣсу въ сѣверной части Засурскаго лѣсничества Городищенскаго уѣзда около озера Сурки.

Gymnadenia cucullata Rich. Сосновый лѣсъ въ дачѣ Сергѣева въ урочищѣ Кичкилейка Городищенскаго уѣзда.

Allium flavescens Bess. Въ Мокшанскомъ уѣздѣ на участкахъ песчаной степи на склонѣ у с. Владыкино и на склонахъ холма Шоломъ у с. Бѣлогорки.

Veratrum nigrum L. Степь „Стрѣлица“ около ст. Арбеково въ Пензенскомъ уѣздѣ.

Carex supina Wahl. Степь около дер. Марьевки Пензенскаго уѣзда; песчаная степь на склонахъ холма Шоломъ около с. Бѣлогорки Мокшанскаго уѣзда.

Rosa bulbosa L. На участкахъ песчаной степи въ Хоневскомъ оврагѣ (между Пензой и Малой Еланью) Пензенскаго уѣзда и на склонахъ у с. Владыкина Мокшанскаго у.

Bromus squarrosus L. По глинистымъ склонамъ около с. Каменки Н.-Ломовскаго уѣзда.

Festuca silvatica Vill. Въ дубово-липовомъ лѣсу около с. Николаевки Мокшанскаго уѣзда.

Atropis distans Gris. На столбчатомъ солонцѣ около села Липяги Пензенскаго уѣзда.

Avena desertorum Less. Въ двухъ пунктахъ южной части Пензенскаго уѣзда: на участкахъ ковыльно типчаковой степи около с. Крутецъ и дер. Поперечной.

Avena flavescens L. Осинникъ по сѣверному склону холма Шоломъ у с. Бѣлогорки Мокшанскаго уѣзда.

Stipa dasyphylla Czern. Изъ видовъ перистаго ковыля наиболѣе рѣдкій въ Пензенской губ.; въ то время, какъ для *S. pennata L. v. typica* и *S. stenophylla Czern.* можно указать по нѣскольکو десятковъ мѣстонахожденій, *S. dasyphylla* встрѣченъ пока лишь въ немногихъ пунктахъ Пензенскаго уѣзда: въ степи у дер. Поперечной, гдѣ попадается въ небольшомъ количествѣ экземпляровъ какъ въ кустарниковой степи, такъ и травяной (на склонахъ и на участкѣ съ *Avena desertorum*). Затѣмъ *S. dasyphylla* замѣченъ въ травяной степи у деревни Марьевки. Въ Мокшанскомъ уѣздѣ я могу пока указать лишь одинъ пунктъ: кустарниковая степь около дер. Алексѣевки (ю.-з. часть уѣзда).

Stipa capillata L. К. А. Космоуекииъ указывалось всего три пункта въ губерніи. Въ настоящее время число извѣстныхъ мѣстонахожденій въ губерніи значительно увеличилось и доходитъ до нѣсколькихъ десятковъ, но нигдѣ въ губерніи не удалось наблюдать это растеніе на равнинѣ и всѣ мѣстонахожденія приурочены къ склонамъ съ южной экспозиціей къ выходамъ кварцевыхъ песковъ, рѣже къ выходамъ карбонатныхъ или другихъ породъ. Кромѣ указывавшихся ранѣе мною пунктовъ, привожу пока слѣдующія мѣстонахожденія: въ Пензенскомъ уѣздѣ—песчаная степь у д. Синяевки, степные склоны у с. Липяги (ю.-з. часть уѣзда); склоны у д. Еланки, склоны между Кривозерьевкой и Веселовкой,

склоны у д. Бардинки; въ Мокшанскомъ уѣздѣ—песчаная степь у с. Владыкина, склоны холма Шоломъ у с. Бѣлогорки, склоны у д. Лягушевки, склоны между Рудаковкой и Александровкой; въ Чембарскомъ уѣздѣ—песчаная степь у дер. Наумовки; въ Саранскомъ уѣздѣ—склоны на холмѣ Чердакъ у с. Бѣлый Ключъ.

Juniperus communis L. Кромѣ Краснослободскаго у., гдѣ можжевелникъ наблюдался еще Космовскимъ, одинъ экземпляръ найденъ въ Засурскомъ лѣсничествѣ Городищенскаго у.


Picea excelsa Link. Ель въ видѣ одиночныхъ экземпляровъ или небольшими группами наблюдается по всему лѣсному району Краснослободскаго уѣзда (на правой сторонѣ Мокши). Въ этой площади найдены лишь пять экземпляровъ въ бору у с. Поливанова Керенскаго уѣзда и одно старое дерево въ бору у с. Ломовки Мокшанскаго уѣзда.

* Lycorodium complanatum L. Боръ около с. Ломовки Мокшанскаго уѣзда и въ борахъ Засурскаго лѣсничества и въ дачѣ Сергѣева около уроч. Кичкилейки Городищенскаго у.

Botrychium Lunaria Sw. Боръ въ дачѣ Сергѣева въ уроч. Кичкилейкѣ Городищенскаго уѣзда.

Botrychium Matricariae Spr. Краснослободскій уѣздъ: березовый лѣсъ въ Уркатской казенной дачѣ.

Onoclea Struthiopteris Hoffm. Въ дубово-липовомъ лѣсу около с. Николаевки Мокшанскаго у.; по оврагу въ березовомъ лѣсу на границѣ Наровчатскаго и Н.-Ломовскаго уѣздовъ по дорогѣ изъ с. Приизерокъ въ с. Кирдяшево; В. С. Малыгинымъ доставлено изъ осинового лѣса между р.р. Мокшей и Мокшанью около с. Лашмы Наровчатскаго уѣзда; на берегу рѣчки около дер. Ключи Пензенскаго уѣзда.



555095

8 Мокшанск

IV

IV

— IV

Ж. В. Дюкина.

Трибные паразиты
Пензенской губернии
1912 г.

Грибные паразиты, собранные въ Пензенской губ. въ 1912 г.

Грибы-паразиты, списокъ которыхъ приводится ниже, собраны были мной въ 1912 г. весной въ Чембарскомъ уѣздѣ, а лѣтомъ и осенью въ окрестностяхъ Пензы. Въ Чембарскомъ уѣздѣ сборы производились въ окрестностяхъ хутора Пески, находящагося въ 2-хъ верстахъ отъ с. Калдусь. Районъ сборовъ былъ очень небольшой, но довольно интересный разнообразіемъ растительныхъ сообществъ. Въ Пензѣ мои сборы такъ-же ограничивались ближайшими окрестностями.

Самыми распространенными грибами являются ржавчинные. Наиболѣе пострадавшимъ изъ культурныхъ растений, была чечевица въ окрестностяхъ с. Калдусь. Весь посѣвъ уже въ началѣ іюня такъ пораженъ былъ ржавчиной—*Uromyces fabae*, что невозможно было найти ни одного неповрежденнаго экземпляра; на урожаѣ это отозвалось самымъ печальнымъ образомъ. Въ окрестностяхъ Пензы, близъ Казеннаго сада, сильно поражены были посѣвы овса грибомъ—*Puccinia coronifera*; однако большого вреда урожаю онъ не принесъ: умолотъ былъ хорошій и солома оказалась годной для корма.

На подсолнечникѣ, повсюду гдѣ я только экскурсировала, паразитировалъ грибокъ—*Puccinia helianthi*.

Въ большемъ количествѣ встрѣчалась ржавчина—*Puccinia pruni spinosae* на сливахъ и терновникѣ въ Пензѣ; а на малинѣ, шиповникѣ, лапчаткахъ сильно распространены были грибки изъ рода *Phragmidium*. На черемухѣ довольно часто встрѣчалась ржавчина—*Pucciniastrum padi*. На березѣ весьма обычнымъ грибомъ сѣдуетъ считать *Melampsoridium betuli*.

пш, а на ивахъ и осинахъ ржавчину изъ рода *Melampsora*. Изъ некультурныхъ растений на хуторѣ, въ окрестностяхъ Калдусъ очень часто встрѣчалась крапива (*Urtica dioica*) въ заросляхъ ивъ, пораженная эцидіями—*Russinia caricis*; щавель-же очень страдалъ отъ эцидіальной стадіи ржавчины *Russinia phragmitis*, начавшей въ іюнѣ развивать уже лѣтнія споры на тростникѣ (*Phragmites communis*).

Въ лѣсу и особенно часто на паровыхъ поляхъ мнѣ встрѣчался татарникъ (*Cirsium arvense*), одно изъ распространеннѣйшихъ здѣсь сорныхъ растений, съ изуродованными листьями, коричневыми отъ покрывавшихъ ихъ уредоспоръ грибка—*Russinia suaveolens*. Также очень распространенными видами *Russinia* были: *P. bardanae*, *P. carduorum*, *P. arenariae*, *P. taraxaci*, *P. schroeteriana*, *P. tinctoriae*. Ржавчина—*Uromices fabae* часто встрѣчалась въ лѣсу на *Orobus vernus* и *Vicia serotum*.

Немногіе собранные мною виды головневыхъ грибовъ встрѣчались въ гораздо меньшемъ количествѣ. Сравнительно чаще другихъ встрѣчался *Ustilago tritici* въ посѣвахъ пшеницы въ с. Калдусъ.

Изъ *Euglenomycetes* очень распространенъ былъ въ окрестностяхъ села Калдусъ грибокъ—*Phyllachora trifolii*, который я собралъ въ конидіальной стадіи—на *Trifolium pratense* и другихъ видахъ клевера. Въ Пензѣ была встрѣчена *Polystigma ochraceum*—на черемухѣ.

Изъ *Discomycetes* въ Пензѣ обращалъ на себя вниманіе своею распространенностью грибокъ—*Rhytisma punctatum* на кленѣ (*Acer tataricum*).

Мучнисторосные въ окрестностяхъ Калдусъ мнѣ почти не встрѣчались, такъ какъ они обычно появляются въ концѣ лѣта, когда меня уже тамъ не было. Въ Пензѣ они были очень распространены особенно въ концѣ осени. Американская мучная роса брыжовника встрѣчалась часто, но пораженія были гораздо слабѣе, чѣмъ въ предыдущіе годы. На хмѣль сильно нападала—*Sphaerotheca humuli*. На сорныхъ

растенияхъ всюду встрѣчались: *Erysiphe galeopsidis* и *E. polygoni*. Чернь, вызываемая грибомъ *Carpodium salicinum* принадлежала также къ числу распространеннѣйшихъ грибовъ на очень многихъ растенияхъ.

Изъ *Fungi imperfecti* въ Калдусахъ на осинѣ часто встрѣчался *Fusicladium radiosum*. На *Aegopodium podagrariae* самой обыкновенной болѣзнью слѣдуетъ считать *Septoria podagrariae*, на липѣ—*Cercospora microsora*. На черной смородинѣ въ Пензѣ сильно была распространена *Septoria ribis*. На крапивѣ всюду встрѣчалась *Ramularia urticae*.

Грибки опредѣлялись мною на Центральной фитопатологической станціи при Императорскомъ Ботаническомъ садѣ въ Петербургѣ подъ руководствомъ А. С. Бондарцева, за что выражаю ему свою глубокую благодарность.

Также приношу свою признательность И. И. Спрыгину за просмотръ моихъ опредѣлений растений—хозяевъ.

Списокъ паразитныхъ грибовъ.

Phycomycetes.

Peronosporaceae.

1. *Peronospora viciae* de By. На *Vicia Cracca* L. 5. VIII. Лѣсъ П. *).
2. *Plasmopara nivea* Schröt. На *Aegopodium padagraria* L. 20. V. К.
3. *Cystopus bliti* Lév. На *Amaranthus retroflexus* L. 15. VI. Поле. К.

Ascomycetes.

Erysiphaceae.

4. *Sphaerotheca mors uvae* Berk. et Curt. На *Ribes grossularia* L. 9. VII. Садъ. П.

*) Сокращения, принятыя въ перечнѣ; П.—окрестности Пензы; К.—с. Калдусъ Чембарскаго уѣзда.

5. *S. pannosa* Lév. На *Rosa* sp. 8. IX. Раз. садъ. П.
- 6. *S. humuli* Westd. На *Humulus lupulus* L. 5. VIII. Садъ. П.
7. *Uncinula aceris* DC. (Конидиальная стадія). На *Acer tataricum* L. 8. IX. Раз. садъ. П. — 29. VIII. Засѣвка. П.
8. *Phyllactinia Corylea* Karst. На *Betula verrucosa* Ehrh. 3. IX. Засѣвка. П.
9. *Oidium dubium* Jacz. На *Quercus pedunculata* Ehrh. 3. IX. Засѣвка. П.
10. *Podosphaera tridactyla* (Wallr.) de By. На *Prunus padus* L. 5. VIII. Засѣвка. П.
11. *Erysiphe galeopsidis* DC. На *Leonorus cardiaca* L. 25. VIII. Садъ. П. На *Galeopsis Tetrabit* L. 5. VIII. Засѣвка. П.
12. *E. polygoni* DC. На *Convolvulus arvensis* L. 20. VIII. Садъ. П. На *Urtica dioica* L. 9. IX. Садъ. П.
- 13. *E. cichoriacerum* DC. На *Lappa* sp. 25. VIII. Окрестн. П.

Perisporiaceae.

15. *Apiosporium salicinum* Kze. (Конидиальная стадія). На *Pirus communis* 3. VIII. Садъ. П. — На *Prunus padus* L. 23. VIII. Садъ. П. — На *Ribes rubrum* L. 3. IX. Садъ. П. — На *Salix caprea* L. 21. IX. Садъ. П. — На *Tilia parvifolia* Ehrh. 3. IX. Засѣвка. П.

Hydrogaceae.

15. *Polystigma rubrum* Tul. На *Prunus spinosa* L. 29. VIII. За Сурой. П.
- 16. *P. ochraceum* (Wahl.) Sacc. На *Prunus padus* L. 29. VIII. За Сурой. П.

Dothidaceae.

17. *Phyllachora trifolii* Fuck. На *Trifolium pratense* и *Trifolium* sp. 6. VI. На лугу. Б.
18. *Ph. graminis* Fuck. На злакѣ. 30 VIII. За Сурой. П.

Phacidiinae.

19. *Rhytisma punctatum* Pers. На *Acer tataricum* L. 3. VIII.
Лѣсъ. П.

— 20. *Rh. salicinum* Fr. На *Salix cinerea* L. 15. VI. К.

Basidiomycetes.

Ustilaginaceae.

21. *Ustilago tritici* Jens. На *Triticum vulgare* 15. VI. Въ посѣвахъ пшеницы. К.

22. *U. panici miliacei* Wint. На *Panicum miliaceum* L. 6. VIII.
Въ посѣвахъ проса. П.

— 23. *U. avenae* Pers. На *Avena sativa* L. 15. VI. Въ посѣвахъ пшеницы. К.

Tilletineae.

24. *Entyloma crastophyllum* Sacc. На *Bromus inermis* (?). 2 II. VI.
На лугу. К.

Pucciniaceae.

25. *Puccinia coronifera* Klebh. II и III. На *Avena sativa* L. 6.
VIII. Овсяное поле близъ Каз. сада. П.

26. *P. phragmitis* Schum. II. На *Phragmites communis* Trin.
23. VI. К.—I. На *Rumex* sp. 14. V. Близъ зарослей *Phragmites*. К.—I. На *Rumex hydrolapathum* Huds. 20 V. Въ долинь. К.

27. *P. Rubigo vera* (DC.) Wint. I. На *Cynoglossum officinale* L. 22. VI. На межѣ. К. На этомъ растеніи *Puccinia* у Sydow (*Monographia Uredinearum*) не указана, поэтому я взяла старое названіе по Saccardo.

28. *P. carduorum* Jacky. II. На *Carduus crispus* L. 3. VI.
Въ ветлахъ. К.

29. *P. Cirsii lanceolati* Schröt. III. На *Cirsium lanceolatum*. II.

— 30. *P. violae* DC. II. На *Viola hirta* L. 10. VI. Въ лѣсу. К.

31. *P. taraxaci* Plowr. II. На *Taraxacum officinale* Wigg. 23.
VI. Лѣсъ. К.

32. *P. suaveolens* Rostr. II. Ha *Cirsium arvense* Scop. 10. VI.
Ha напу. К.
33. *P. caricis* (Schum.) Reb. I. Ha *Urtica dioica* L. 20. V.
Въ ветлахъ. К.
34. *P. pyrethri* Rabh. II. Ha *Pyrethrum corymbosum* W. 10.
VI. Лѣсъ. К.
35. *P. Bardanae* Corda. II. Ha *Lappa tomentosa* Lam. 10. VI.
Въ ветлахъ. К.
36. *P. helianthi* Schw. II и III. Ha *Helianthus annuus* L. 25.
VIII. Въ огородѣ. П.
37. *P. pruni spinosae* Pers. III. Ha *Prunus domestica* L. 3.
IX. Садъ. II. Ha *Prunus spinosa* L. 30. VIII. Лѣсъ
за Сурой. П.
38. *P. arenariae* Wint. III. Ha *Malachium aquaticum* Fr. 10.
VI. Въ ветлахъ. К.
39. *P. absinthii* DC. III. Ha *Artemisia Absinthium* L. 3. IX.
Засѣка. П.
40. *P. schroeteriana* Klebh. I. Ha *Serratula heterophylla* Desf
20. VI. Лѣсъ. К.
41. *P. tinctoriae* P. Magn. III. Ha *Serratula heterophylla* Desf.
20. VI. Лѣсъ. К.
- 42. *P. graminis* Pers. I. Ha *Berberis vulgaris* L. Каз. садъ. П.
43. *Uromices poae* Rabenh. I. Ha *Ranunculus auricomus* L. 6.
V. Лѣсъ. К. II. Ha *Poa serotina* Ehrh. 10. VI. Въ
ветлахъ. К.
44. *U. rumicis* Schum. II. Ha *Rumex* sp. 17. VI. Въ ветлахъ. К.
45. *U. scrophulariae* Wint. I. Ha *Scrophularia nodosa* L. 10.
VI. Лѣсъ. К.
- 46. *U. fabae* (Pers.) de By I. Ha *Orobis vernus* L. 10. VI.
Лѣсъ. К. II и III. Ha *Vicia sepium* L. 10. VI. Лѣсъ.
К. II. Ha *Ervum* sp. 17. VI. Поле. К.
47. *Phragmidium subcorticium* Wint. II и III. Ha *Rosa* sp. 25.
VIII. П.
48. *Ph. rubi idaei* Karst. II. Ha *Rubus idaeus* L. 25. VIII.
Садъ. П. I. Ha *Rubus idaeus* L. 10. VI. Лѣсъ. К.

49. *Ph. potentillae* Wint. II. На *Potentilla heptophylla*. 20. VI. Лѣсъ. Б. III. На *Potentilla argentea* L. 3. IX. Засѣка. II.
50. *Gymnosporangium tremelloides* Hartig. I. На *Pirus malus* L. 28. VIII. Садъ. II.

Melampsoraceae.

51. *Pucciniastrum padi* Diet. II. На *Prunus padus* L. 10 и 29. VIII. II.
52. *Melampsoridium betulinum* Kleb. II. На *Betula verrucosa* L. 29. VIII. Лѣсъ за Сурой. II.
53. *Melampsora populina* Jacq. II. На *Populus tremula* L. 29. VIII. Засѣка. II. II и III. На *Salix caprea* L. 3. IX. Садъ. II.

Coleosporiaceae.

54. *Coleosporium campanulae* (Pers.) Lév. II. На *Campanula rapunculoides* L. 25. VIII. Садъ. II.

Fungi imperfecti.

Hyphomycetes.

55. *Fusicladium deadriticum* Fuck. На *Pirus malus* L. 25. VIII. Садъ. II.
56. *F. radiosum* Sacc. На *Populus tremula* L. 10. VI. Лѣсъ. Б.
57. *Ramularia urticae* Ces. На *Urtica dioica* L. 28. VIII. Садъ. II.
58. *Alternaria* sp. На *Pirus malus* L. 1. VIII. Садъ. II.
59. *Cercospora microsora* Sacc. На *Tilia parvifolia* L. 29. VIII. Засѣка. II.

Sphaeropsidales.

60. *Septoria chelidonii* Desm. На *Chelidonium majus* L. 3. IX. Въ саду. II.
61. *S. ribis* Desm. На *Ribes nigrum* L. 5. IX. Садъ. II.
62. *S. bromi* Sacc. На *Bromus erectus* L. II. VI. На лугу. Б.

63. *S. podagrariae* Sacc. Ha *Aegopodium podagrariae* L. 10. VI. R.
64. *S. scabiosicola* Desm. Ha *Knautia arvensis* L. 3. VI. Ha
лугу. R.
65. *S. silvestris* Pass. Ha *Lathyrus* sp. 10. VI. R.
66. *Phyllosticta podagrariae* Oudem. Ha *Aegopodium podagrariae*
L. 10. VI. R.
67. *Vermicularia* sp. Ha *Quercus pedunculata* L. 10. VIII. R.
-

Э. К. Штуkenбергъ.

Списокъ

грибовъ-вредителей,

хранящихся въ музеѣ Пензенскаго Общества
Любителей Естествознанія.

Въ дополненіе къ списку паразитныхъ грибовъ, составленному Н. В. Дюкиной, позволяю себѣ помѣстить списокъ грибовъ-вредителей, хранящихся въ музеѣ Пензенскаго Общества Любителей Естествознанія. Нѣкоторые изъ нихъ собраны мною въ 1911 году, въ мѣстности около платформы „Чаадаевскій Боръ“, въ районѣ перехода Сызрано-Вяземской желѣзной дороги на 908/909 верстѣ черезъ р. Суру, и въ пограничной полосѣ Кузнецкаго уѣзда Саратовской губерніи съ Городищенскимъ уѣздомъ Пензенской губерніи; поэтому сборы лѣта 1911 года указаны изъ двухъ губерній. Названное пространство покрыто лугами и болотами въ поймѣ рѣки Суры и сосновымъ лѣсомъ, принадлежащимъ Удѣльному Вѣдомству, мѣстами съ примѣсью лиственныхъ породъ; далѣе къ рч. Уранкѣ начинается мелкій исключительно лиственный лѣсъ крестьянъ д. Уранки и ихъ поля.

Лѣто 1911 года было сухое и особаго развитія грибовъ не замѣчалось, кромѣ *Cercospora microsora* въ видѣ мелкихъ сѣроватыхъ округлыхъ пятенъ съ темной каймой на листьяхъ липы, который встрѣчался обильно во всемъ указанномъ районѣ, а также далѣе, верстѣ за шесть, въ казенномъ лѣсу у р. Кадады и у рч. Сюзюмки; наблюдалась *Russinia soropata* въ видѣ желтыхъ подушечекъ на листьяхъ ломкой крушины въ поймѣ рч. Уранки. Сильно страдали посѣвы гороха крестьянъ д. Уранки отъ ржавчины гороха (*Uromyces pisi*) и посѣвы овса отъ пыльной головки (*Ustilago avenae*).

Остальные грибы собраны мною: 1) у разъѣзда Елюзанъ Сызрано-Вяземской желѣзной дороги, расположеннаго въ Кузнецкомъ уѣздѣ Саратовской губерніи (1910 и 1911 г.г.). 2) въ окрестностяхъ г. Пензы (1911 г.) и при поѣздахъ, 3) въ г. Городище Пензенской губерніи въ сентябрѣ 1911 г.

и 4) въ Курмышскій уѣздъ Симбирской губерніи въ мартѣ 1912 г. Изъ сборовъ лѣта 1913 года помѣщены въ списокъ только грибы изъ порядка *Hymenomycetae*. Они собраны въ Городищенскомъ уѣздѣ Пензенской губерніи въ лиственныхъ и сосново-лиственныхъ лѣсахъ казенныхъ лѣсничествъ Засурскаго и Леонидовскаго и частновладѣльческихъ урочища Кичкилейка.

На живыхъ деревьяхъ наблюдалось нѣсколько видовъ изъ трутовыхъ: *Fomes igniarius*, f. *tremulae* ¹⁾ на осинахъ, сильно поражающій ихъ, f. *quercus* ¹⁾ на дубахъ; единично *Fomes conchatus* на дубѣ (или липѣ (?) и *Daedalea unicolor* на березѣ. Большинство трутовыхъ снято съ пней, какъ *Daedalea quercina* (съ пней дубовъ), *Fomes unguatus* (съ пней сосенъ), или съ уже отмершихъ березъ—особенно часто *Fomes fomentarius* и *Polystictus velutinus*. Нерѣдко на такихъ отмершихъ и лежащихъ на землѣ березахъ наблюдалось по нѣскольку видовъ, чаще *Fomes fomentarius*, *Polystictus pergamenus* и *Lenzites tricolor*.

На землѣ во многихъ участкахъ смѣшаннаго сосново-лиственного лѣса встрѣчался *Polystictus perrenis* въ видѣ различнаго размѣра округлыхъ плоскихъ, помѣщенныхъ на центральной ножкѣ шляпокъ съ коричневыми и блѣдно-сѣрыми концентрическими зонами. Изъ другихъ грибовъ отмѣтимъ *Thelephora terrestris*, растущую на землѣ въ болѣе чистыхъ сосновыхъ насажденіяхъ густыми группами или рядами въ видѣ коричневыхъ слегка мохнато-шероховатыхъ вверхъ торчащихъ плодовыхъ тѣлъ.

Кромѣ того въ списокъ включены сборы Ф. Ф. Федорова въ Старо-Атмашинской казенной лѣсной дачѣ, урочища Коробкова Хвалынского уѣзда Саратовской губерніи, И. И. Спрыгина въ различныхъ уѣздахъ Пензенской губерніи и другихъ лицъ. Фамилія собравшаго указана для каждаго мѣста сбора; безъ указанія лица собраны мною.

¹⁾ Формы приняты согласно работы А. С. Бондарцева „Грибы, собранные въ Брянскомъ опытномъ лѣсничествѣ“. 1912.

Для опредѣленія грибы были посланы на Центральную фитопатологическую станцію при Императорскомъ С.-Петербургскомъ Ботаническомъ Садѣ Петра Великаго, гдѣ были любезны опредѣлены—паразитные грибы на травянистыхъ растеніяхъ И. А. Оль и Н. В. Юревичъ (опредѣленія послѣдней провѣрены А. С. Бондарцевымъ), остальные А. С. Бондарцевымъ. Единичные экземпляры были опредѣлены другими лицами, на что указывается въ выносахъ.

Выражаю искреннюю признательность всѣмъ поименованнымъ лицамъ за опредѣленіе и А. С. Бондарцеву особо за неоднократныя указанія при составленіи данной коллекціи и списка.

Сокращенія, принятые въ списокъ:

Пенз. г. — Пензенская губернія.
Пенз. у. — Пензенскій уѣздъ.
Гор. у. — Городищенскій уѣздъ.
Чемб. у. — Чембарскій уѣздъ.
Мокш. у. — Мокшанскій уѣздъ.
Сар. г. — Саратовская губернія.
Кузн. у. — Кузнецкскій уѣздъ.
Хвал. у. — Хвалынскій уѣздъ.
Симб. г. — Симбирская губ.

Курм. у. — Курмышскій уѣздъ.
Сызр. у. — Сызранскій уѣздъ.
Каз. г. — Казанская губернія.
С.-В. ж. д. — Сызрано-Вяземская жел. дорога.
М.-К. ж. д. — Московско-Казанская жел. дорога.
И. П. Спрыг. — И. П. Спрыгинъ.
Ф. Ф. Фед. — Ф. Ф. Федоровичъ.
Е. К. Штук. — Е. К. Штуkenбергъ.

Phycomycetes.

1. *Frankia subtilis* Brunch. ¹⁾ на корняхъ ольхи (?). Пенз. г. Пенз. у., ст. Арбеково С.-В. ж. д., ольшаникъ у Двойныхъ Горъ. 9. IV. 1905 (И. П. Спрыг.).

Hemibasidii.

2. *Ustilago avenae* (Pers.) Jens. на *Avena sativa* L. Пенз. г. Гор. у., посѣвы крестьянъ д. Уранки. 8. VII. 1911.

¹⁾ Опредѣленъ А. А. Еленкинымъ.

3. *Ust. zeae* (Beckmann) Unger. ¹⁾ (= *Ust. maydis* Cda) на *Zea mays* L. г. Пенза, садъ училища садоводства, лѣто 1912 (А. И. Журавскій).
4. *Conractia caricis* (Pers.) Magn. на *Carex pediformis* C. A. M. г. Пенза, лѣсъ училища садоводства. 30. V. 1910.

Basidiomycetes.

Protobasidiomycetes.

5. *Aecidium asperitollii* Pers. на *Pulmonaria officinalis* L. Пенз. г. Гор. у., лиственный лѣсъ у д. Уранки. 8. VII. 1911 (I стадія); на *Pulmonaria angustifolia* L. Сар. г. Кузн. у., удѣльный сосновый лѣсъ. 15. VI. 1911 (I ст.).
6. *Aec. serratulae* Schröt. на *Serratula heterophylla* Desf. Пенз. г. Пенз. у., ст. Рамзай С.-В. ж. д., степь. 25. V. 1911 (I) (Е. К. Штук. и И. И. Спрыг.).
7. *Uredo pirolae* (Gmel.) Wint. на *Pirola chlorantha* Sw. Сар. г. Кузн. у., удѣльный сосновый лѣсъ. 19. VI. 1911 (II).
8. *Russinia betonica* (Alb. et Schw.) DC. на *Betonica officinalis* L. Пенз. г. Пенз. у. д. Елшанка, степные склоны. 3. VI. 1911 (III).
9. *Rus. coronata* Corda на *Rhamnus frangula* L. Сар. г. Кузн. у., удѣльный сосновый лѣсъ. 15. VI. 1911 (I).
10. *Rus. graminis* Pers. на *Triticum repens* L. Сар. г. Кузн. у., дубовая роща въ поймѣ р. Суры. 27. VI. 1911 (II).
11. *Rus. silvatica* Schröt. на *Taraxacum vulgare* (Lam.) Schrank. Пенз. г. Пенз. у. ст. Рамзай С.-В. ж. д., степь. 25. V. 1911 (I) (Е. К. Штук. и И. И. Спрыг.).
12. *Rus. violae* (Schum.) DC. на *Viola hirta* L. Сар. г. Кузн. у., лугъ у р. Суры. 17. VI. 1911 (II).
13. *Oromyces fabae* (Pers.) Schröt. на *Orobis vernus* L. Пенз. г. Гор. у., лиственный лѣсъ у д. Уранки. 8. VII. 1911 (II, III).

¹⁾ Определенъ въ Пензенскомъ училищѣ садоводства.

14. *Ur. pisi* Wint. на *Pisum sativum* L Пенз. г. Гор. у., посѣвы крестьянъ д. Уранки. 8. VII. 1911 (III).
15. *Ur. minor* Schröt. на *Trifolium montanum* L. Пенз. г. Гор. у., отъ д. Павловки къ г. Городище 7. IX. 1911 (III).
16. *Coleosporium petasites* De By на *Petasites tomentosus* DC. Сар. г. Кузн. у., версты 4 отъ раз. Елюзань, берегъ рч. Сюзюмки. 1. VII. 1911 (II); г. Пенза, между рр. Пензой и Свиной. 2. IX. 1912 (II) (Е. К. Штук. и И. И. Спрыг.).
17. *Phragmidium potentillae* (Pers.) Wint. на *Potentilla heptaphylla* Mill. Сар. г. Кузн. у., пойма р. Суры. 12. VIII. 1911 (II, III).
18. *Triphragmium filipendulae* Lasch. ¹⁾ на *Filipendula hexapetala* Gilb. Сар. г. Кузн. у., версты 4 отъ раз. Елюзань. 19. V. 1911 (II).
19. *Tr. ulmariae* (Schum.) Wint. на *Filipendula ulmaria* Max. Сар. г. Кузн. у., заросль въ поймѣ р. Суры. 28. VI. 1911 (II, III).

Autobasidiomycetes.

20. *Exobasidium vaccinii* Wor. на *Vaccinium Vitis idaea* L. Сар. г. Кузн. у., удѣльный сосновый лѣсъ. 28. VI и 12. VII. 1911; Пенз. г. Гор. у. Засурское лѣсничество и уроч. Кичкилейка, сосновый лѣсъ. VII. 1913. (Е. К. Штук. и И. И. Спрыг.).
21. *Polyporus adustus* (Willd.) Fr. Пенз. г. Гор. у., оврагъ у с. Архангельскаго, съ пня березы. 7. IX. 1911.
22. *Pol. betulinus* Fr. Сар. г. Кузн. у., сосново-лиственный лѣсъ къ рч. Уранкѣ, съ березы. 13. VIII. 1911; Пенз. г. Гор. у. Засурское лѣсничество и уроч. Кичкилейка, съ упавшихъ березъ. VI—VIII. 1913.
23. *Pol. rutilans* (Pers.) Fr. Сар. г. Кузн. у., сосново-лиственный лѣсъ къ рч. Уранкѣ, съ березы, 13. VIII. 1911; Сар. г. Хвал. у. 1912 (Ф. Ф. Фед.).

¹⁾ Опредѣленъ А. А. Еленкинымъ.

24. *Pol. Schweinitzii* Fr. Сар. г. Кузн. у., версты 3 отъ раз. Елюзань, съ пня сосны, 30. VI. 1910¹⁾; Пенз. г. Гор. у., уроч. Кичкилейка, сосново-лиственный лѣсъ, съ пней лиственныхъ деревьевъ. VII и VIII. 1913.
- ✓ 25. *Pol. spruceus* (Sow.) Fr. Пенз. г. Гор. у. Леонидовское лѣсничество, лиственный лѣсъ, съ живого дуба (или липы(?)). 20. VIII. 1913.
26. *Pol. squamosus* (Huds.) Fr. Пенз. г. Гор. у. Засурское лѣсничество, съ черемухи. 1912 (Ф. А. Лабурцевъ); Пенз. г. Гор. у., Засурское лѣсничество, сосново-лиственный лѣсъ, съ пня. 21. VIII. 1913.
27. *Pol. sulfureus* (Bull.) Fr. Сар. г. Кузн. у., пойма р. Суры, съ дуба. 15. VIII. 1911.
28. *Fomes applanatus* (Pers.) Wallr. Симб. г. Курм. у., Алгашинское лѣсничество, съ березы. 19. III. 1911; Сар. г. Кузн. у., пойма р. Суры, съ пня лиственного дерева. 11. VIII. 1911; Пенз. г. Гор. у., уроч. Кичкилейка, сосново-лиственный лѣсъ, съ пня лиственного дерева. VII. 1913.
29. *F. conchatus* (Pers.) Fr. Пенз. г. Гор. у. уроч. Кичкилейка, съ пня лиственного дерева. VII. 1913.
30. *F. fomentarius* (L.) Fr. Пенз. г. Мокш. у. ст. Лунино М.-Б. ж. д. Кирѣевскій хуторъ, 5. VIII. 1905 (В. Дормидонтовъ); Пенз. г. Пенз. у. ст. Арбеково С.-В. ж. д. 21. I. 1908, тамъ же съ осины въ чернолѣсьѣ, 9. IV. 1905 (И. И. Спрыг.); г. Пенза, лѣсъ училища садоводства. 25. IV. 1908 (И. И. Спрыг.); Пенз. г. Пенз. у. ст. Рамзай С.-В. ж. д., съ березы и съ пня березы. 25. VI. 1911 (Е. К. Штук. и И. И. Спрыг.); Пенз. г. Гор. у., лѣсъ близъ г. Городище, съ пня березы. 7. IX. 1911; Симб. г. Курм. у. Алгашинское лѣсничество, съ березы. IX. 1911. (А. А. Штукенбергъ); Пенз.

¹⁾ Переданъ въ гербарій низшихъ споровыхъ растений Императорскаго Ботаническаго Сада Петра Великаго.

- г. Гор. у. Засурское лѣсничество и уроч. Кичкилейка, съ засохшихъ и упавшихъ березъ. VII—VIII. 1913.
31. *F. igniarius* (L.) Fr. f. *resupinata*, Пенз. г. Пенз. у. ст. Арбеково, на пни въ чернолѣсѣ. 9. IV. 1905 (И. И. Спрыг.); f. съ живой яблоня, Пенз. г. Саранск. у. г. Саранскъ, садъ. 14. IX. 1913. (И. П. Поповъ-Прѣсноть); f. *tremulae*, Сар. г. Кузн. у. раз. Елюзань, казенный лѣсъ, съ живой осины. 20. V. 1911; Каз. г., удѣльный лѣсъ у ст. Киря М.-Б. ж. д. 20. III. 1911; Пенз. г. Гор. у. уроч. Кичкилейка, лиственный лѣсъ, съ живыхъ осинъ. VII—VIII. 1913 г.; f. *quegus*, Пенз. г. Гор. у. Леонидовское лѣсничество, съ живого дуба. VIII. 1912 (П. М. Булгаковъ); Пенз. г. Гор. у. уроч. Кичкилейка, лиственный лѣсъ, съ живого дуба. VII—VIII. 1913 и Леонидовское лѣсничество, съ живого дуба. 20. VIII. 1913.
32. *F. unguatus* Schaeff (= *F. marginatus* Fr., = *F. pinicola* Fr.). Пенз. г. Пенз. у. ст. Рамзай С.-В. ж. д., съ пня березы. 25. V. 1911. (Е. Б. Штук. и И. И. Спрыг.); Пенз. г. Чемб. у. Чернышево, моховое болото 17. VI. 1911 (И. И. Спрыг.); Пенз. г. Гор. у. ст. Чаадаевка С. В. ж. д., удѣльный сосновый лѣсъ, съ пня сосны, 16. VIII. 1911; Сар. г. Кузн. у., удѣльный сосновый лѣсъ, съ пня сосны. 12. VIII. 1911; Каз. г., удѣльный елово-лиственный лѣсъ у ст. Киря М.-Б. ж. д., съ березы. 20. III. 1912; Пенз. г. Гор. у. уроч. Кичкилейка, съ пня сосны. VII. 1913.
33. *Polystictus perennis* (L.) Fr. Пенз. г. Гор. у. Засурское лѣснич. и уроч. Кичкилейка, сосново лиственный лѣсъ, на землѣ. VII—VIII. 1913.
34. *P. pergamenus* Fr. (= *P. simulans* Blonsk.) Каз. г., удѣльный лѣсъ у ст. Киря М.-Б. ж. д., съ березы. 20. III. 1911; Пенз. г. Гор. у. Засурское лѣснич., сосново-лиственный лѣсъ, съ лежащихъ березъ. 19. VIII. 1913.

35. *P. versicolor* (L.) Fr. Сар. г. Кузн. у., версты 4 отъ раз. Елюзань, 9 VII. 1910; Сар. г. Кузн. у., удѣльный сосновый лѣсъ, съ пня березы. 10. VII. 1911; Симб. г. Сызр. у., верховье рч. Ахметлейки, съ упавшаго дуба (?). 11. IX. 1911 (А. А. Штукенбергъ); Сар. г. Хвѣл. у. 1912 (Ф. Ф. Фед.); Пенз. г. Гор. у. Засурское лѣснич., сосново-лиственный лѣсъ, съ пня липы. 18. VIII. 1913 и уроч. Кичкилейка, съ пня лиственного дерева. VII. 1913.
36. *P. velutinus* Fr. Сар. г. Кузн. у., версты 4 отъ раз. Елюзань. 24. VI. 1910; Сар. г. Кузн. у., удѣльный сосновый лѣсъ, съ рябины. 7. VII. 1911; Пенз. г. Гор. у., Засурское лѣснич., сухія вѣтки березы. 21. VIII. 1913; Пенз. г. Гор. у. уроч. Кичкилейка, съ лежащей осины. 30. VII. 1913 (И. И. Спрыг.).
37. *P. hirsutus* Fr. Сар. г. Кузн. у., удѣльный сосновый лѣсъ, съ пня березы. 7. VII. 1911.
38. *P. radiatus* (Sow.) Fr. Симб. г. Курм. у., Алгаишское лѣсничество. 12. II. 1912.
39. *P. vulpinus* Fr. (= *Polyporus cuticularis* (Bull.) Fr.). Пенз. г. Пенз. у., ст. Арбеково С. В. ж. д. 23. IV. 1908 (И. И. Спрыг.); г. Пенза, садъ училища садоводства (И. И. Спрыг.).
40. *Trametes mollis* (Somm.) Fr. Пенз. г. Гор. у., оврагъ у с. Архангельскаго, съ пня березы. 7. IX. 1911.
41. *Tr. cinnabarina* (Jacq.) Fr. Сар. г. Кузн. у., версты 4 отъ раз. Елюзань, казенный лѣсъ, съ березы. 3. VII. 1910; Сар. г. Кузн. у., удѣльный сосновый лѣсъ, съ рябины. 7. VII. 1911.
42. *Tr. rubescens* (Alb. et Schw.) Fr. (= *Lenzites sibirica* Karst.). Сар. г. Кузн. у., версты 4 отъ раз. Елюзань. 17. VII. 1910.
43. *Tr. serialis* Fr. Пенз. г. Гор. у. Засурское лѣснич., сосново-лиственный лѣсъ, съ пня сосны. 13. VII. 1913 и уроч. Кичкилейка, съ лежащей сосны. 12. VII. 1913.

44. *Daedalea unicolor* (Bull.) Fr. Пенз. г. Гор. у., лиственный
лѣсъ у г. Городище, съ пня березы. 7. IX. 1911; Пенз.
г. Гор. у., Засурское лѣснич., сосново-лиственный лѣсъ,
съ живой березы 18. VIII 1913.
45. *D. quercina* (L.) Pers. Окрестности г. Пензы, у оз. Про-
ломны, съ пня дуба. 13. IV. 1895. (И. И. Спрыг.) и
у Сергѣевской рощи, съ пней дубовъ. 27. IV. 1898
(И. И. Спрыг.); г. Пенза, лѣсъ училища садоводства,
съ пней дубовъ IV. 1913; окрестности г. Пензы, сосново-
лиственный лѣсъ на 8-ой верстѣ у Сурки, съ пня дуба.
26. V. 1913; Пенз. г. Гор. у., Засурское лѣсничество
и уроч. Кичкилейка, съ пней дубовъ. VI—VIII. 1913.
46. *Lenzites betulina* (L.) Fr. Пенз. г. Гор. у., уроч. Кич-
килейка, съ пня. 12. VII. 1913.
47. *L. tricolor* (Bull.) Fr. Сар. г. Кузн. у., удѣльный со-
сновый лѣсъ, съ березы. 13. VII. 1911; Пенз. г. Гор. у.
Засурское лѣснич. и уроч. Кичкилейка, сосново-листвен-
ный лѣсъ, съ лежащихъ березъ. 9 и 18. VIII. 1913.
48. *Merulius lacrymans* (Jacq.) Fr. г. Пенза. XI. 1911. (Н. В.
Дюкина); Сар. г. Хвал. у., домъ лѣсничаго. 1911.
(Ф. Ф. Фед.).
49. *Thelephora terrestris* Ehrh. Пенз. г. Гор. у. Засурское
лѣснич. и уроч. Кичкилейка, въ основномъ и листвен-
номъ лѣсу на землѣ. VII—VIII. 1913.
50. *Stereum crispum* (Pers.) Shröt. Пенз. г. Гор. у. уроч. Кич-
килейка, сосново-лиственный лѣсъ, съ пня лиственного
дерева. 13. VIII. 1913.
51. *St. hirsutum* (Willd.) Fr. г. Пенза, съ пня дуба. X. 1910.
52. *Hudnum auriscalpium* L. Сар. г. Кузн. у., версты 4 отъ
раз. Елюзань, казенный сосновый лѣсъ у рч. Сюзюмки,
на упавшихъ шишкахъ 9. VII. 1910; Пенз. г. Гор. р.
Засурское лѣсничество, сосново-лиственный лѣсъ, на
упавшихъ шишкахъ сосны. VII. 1913.
53. *Schizophyllum alneum* (L.) Schröt. Сар. г. Хвал. у. 1912
(Ф. Ф. Фед.).

Ascomycetes.

Perisporiaceae.

54. *Sphaerotheca humili* (DC.) Burr. на *Humulus lupulus* L. Сар. г. Хвал. у. 1912 (Ф. Ф. Фед.).
55. *Erysiphe cichoracearum* (DC.) Schröt. на *Artemisia vulgaris* L. Сар. г. Хвал. у. 1912. (Ф. Ф. Фед.).

Pyrenomycesae.

56. *Nectria cinnabarina* (Tode) Fr. Сар. г. Кузн. у. раз. Елюзань, казенный сосново-лиственный лѣсъ, отмершая вѣтка. 20. V. 1911.
57. *Epichloe typhina* Tul. на *Bromus ramosus* Huds (= *Br. asper* Murr.) ¹⁾, Сар. г. Кузн. у., версты 4 отъ раз. Елюзань, лѣсъ у рч. Сюзюмки, 1. VII. 1911; на *Agropyrum repens* (L.) P. B. ¹⁾ Пенз. г. Гор. у., лиственный лѣсъ у д. Уранки. 8. VII. 1911.
58. *Polystigma ochraceum* (Wahl.) Sack., на листьяхъ *Prunus radus* L., Пенз. г. Гор. у., пойма р. Уранки у впадения въ р. Суру. 8. VII. и 12. VII. 1911.

Hysteriaceae.

59. *Hysterium pulicare* Pers. на корѣ *Betula verrucosa* Ehrh.. Симб. г. Курм. у., Алгашиновское лѣсничество. 19. III. 1912

Discomycetae.

60. *Rhytisma salicinum* (Pers.) Fr. на листьяхъ *Salix* sp. Пенз. г. Гор. у., оврагъ у с. Архангельскаго. 7. IX. 1911.

Fungi imperfecti.

Sphaeropsideae.

61. *Septoria agropyri* Ell. et Ev. на *Triticum repens* L. Сар. г. Кузн. у., дубовая роща въ поймѣ р. Суры. 27. VI. 1911.

¹⁾ Растение—хозяинъ определенъ Р. Ю. Рожевльцъ.

62. *S. bidentis* Sacc. на *Bidens tripartitus* L. Сар. г. Кузи. у.,
версты 4 отъ раз. Елюзань, болото. 18. VII. 1910.
63. *S. ribis* Desm. на *Ribes* sp. Сар. г. Хвал. у. 1912
(Ф. Ф. Фед.).
64. *S. santonensis* Pass. на *Salix* sp. Сар. г. Хвал. у. 1912
(Ф. Ф. Фед.).

Н у р н о м у с е т е а е.

65. *Cercospora microsora* Sacc. на *Tilia parviflora* Ehrh. Сар. г.
Кузи у., казенный сосново-лиственный лѣсъ близъ д.
Н. Елюзань. 4. VII. 1911.
66. *Ramularia picridis* Faurt. et. Roum. на *Picris hieracioides* L.
Сар. г. Кузи. у., дуга на берегу р. Кадады. 30. VI. 1911.
-

5.20 con